

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 06.05.1999 - 3619

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	500 g/100 L su	21 gün
	Ölököl (<i>Phomopsis viticola</i>)	3500 g/100 L su (kış uygulaması) 500 g/100 L su (yaz uygulaması)	21 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	1500 g/100 L su	21 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i> = <i>Stigmia carpophila</i>)	1250 g/100 L su (dormant dönem) 625 g/100 L su (normal dönem)	21 gün
Şeftali, Nektarin	Yaprak kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	1500 g/100 L su	21 gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 g/da	14 gün
Zeytin	Halkalı leke (<i>Spilocaea oleaginea</i> = <i>Cyclogonium oleaginum</i>)	1. uygulama 1500 g/100 L su 2. uygulama 1000 g/100 L su	21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Mildiyösi

Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yörelerde:

- ilaçlama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
- ve daha sonraki ilaçlamalar: Birinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınmalıdır.

Kullanılan ilacın etki süresi bitiminde, bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda ilaçlamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir.

LANCES LINK
by DSG

**MANICA BORDEAUX MIXTURE
ISLANABİLİR TOZ (WP)**

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	----------------------------

%20 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.**
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ağızdan alındığında baş ağrısı, kusma ve sindirim sisteminde ağrılara neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Ürün ambalaj ve etiketini beraberinizde bulundurun.

Deriye teması halinde, bulaşık vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın ve su ve sabunla yıkayın. Tahriş durumunda bir doktor ya da ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Göze teması halinde, hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15-30 dakika yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi tavsiye/yardım alın.

Solunması halinde, uygun havalandırma kullanarak maruziyeti azaltın. Hastayı temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda dinlendirin. Kendinizi iyi hissetmezseniz ZEHİR MERKEZİ'ni veya doktor/hekimi arayın.

Yutulması halinde, hemen ZEHİR MERKEZİ'ne veya doktora başvurun. Hemen onlara ürün güvenlik bilgi formunu ve etiketi gösterin. Bilinci açık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin.

NET MİKTARI (kg) :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER:

Bordo Bulamacı

ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P264: Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Ürünü kapalı orijinal ambalajında, ısı kaynaklarından uzakta depolayınız. Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Boşalan ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaçla kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdırık Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4265
Sermaye:63.600.000 TL
Mersis No:0608001426500013

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

23 Temmuz 2019

Bağda Ölükol:

- Dormant dönem ilaçlaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan (tomurcuk patlamasından) 3-4 hafta önce dormant dönem uygulaması yapılır.
- Yeşil aksam ilaçlaması: Vejetasyon döneminde aşağıdaki programa göre yapılır.
1. İlaçlama: Gözlerin uyanma (Tomurcuk patlaması) başlangıcında,
 2. İlaçlama: Sürgünler 8-10 cm uzunluğa ulaştığı dönemde,
 3. İlaçlama: Çiçeklenme döneminden hemen önce (çiçek salkımlarının belirmediği dönemde),
 4. İlaçlama: Çiçeklenme sonu-tane seti oluşumu başlangıcında yapılmalıdır.

Elma Karalekesi:

Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yerlerde:

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),
2. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde),
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, kullanılan preparatların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çil) (Kayısı):

- 1.İlaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden sonra
- 2.İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır. Kayısılarda ilave olarak meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali ve Nektarinde Yaprak Kıvrıklığı:

- 1.ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,
- 2.ilaçlama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Domates Mildiyözü: Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise ilaçlamaya çevrede yada tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

Zeytinlerde Halkalı Leke:

- Marmara Bölgesinde: 1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
- Ege Bölgesinde: 1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce.
3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.
- *Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.
- Akdeniz Bölgesinde: 1. ilaçlama: Hasattan sonra,
2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.



MANICA BORDEAUX MIXTURE ISLANABİLİR TOZ (WP)

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	----------------------------

%20 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Panzehir: Methemoglobinemi, BAL, DMPS, EDTA ve D-penisilamin için Metilen Blue uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı; ürünün hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0232 202 11 44
www.lanceslink.com

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

MANICA S.p.A.
Via all'Adige, 4
38068 Rovereto, (Trento) İTALYA
Tel: +39 (0) 464 433705

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdirik Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4265
Sermaye:53.500.000 TL
Mersis No:0608001426500013

Durmuş BÖLÜK
Şirket Yetkilisi



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

23 Temmuz 2023

91 1

MANICA BORDEUAX MIXTURE hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MANICA BORDEAUX MIXTURE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MANICA BORDEAUX MIXTURE'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle (insektisit, fungusit, bitki gelişim düzenleyicisi vb.) karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

LANCES LINK
by DSG

**MANICA BORDEAUX MIXTURE
ISLANABİLİR TOZ (WP)**

Grubu	M1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	----------------------------

%20 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN.TİC.A.Ş.
Kazımdırık Mah.296 Sk.No:8 İç Kapı No:217
35100 Bornova/İZMİR Tel:0232 202 11 44
Hasan Tahsin V.D.608 001 4266
Sermaye:53.500.000 TL
Mersis No:0608001426500013



Durmuş DEMİRCİ
Genel Müdür

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

23 Temmuz 2018

