



ZEYTİN YAPRAK UYGULAMA PROGRAMI

1-Sürgün Hareket Dönemi(15-25 Mart);

Borozinc 150 gr/100 lt su

Novazot Immün 500 ml/100 lt su

Not; Zeytin pamuklu bit 1. döl ilacı karıştırılabilir. (deltamethrin vs.)



2-Çiçeklenme öncesi;

Stimphos Zn 250 ml/100 lt su

Borozinc 150 gr/100 lt su

Correctus 250 ml/100 lt su

Not; Zeytin pamuklu bit ilacı 2.döl ve Antraknoz ilacı karıştırılabilir.



3-Çiçeklenme Sonrası /Meyve Tutumu Dönemi;

Correctus 250 ml/100 lt su

Capfol 250 ml/100 lt su



4-Meyveler Nohut Büyüklüğüne Geldiği Dönemde

(çekirdek sertleşmeye başladığı dönem);

Stimphos Zn 250 ml/100 lt su

Soluprod 20.20.20 250 gr/100lt su



5-Meyveler $\frac{3}{4}$ Büyüklüğüne Ulaştığı Dönem;

Nova K	250ml/100lt su
Borozinc	150 gr/100 lt su
Correctus	250 ml/100 lt su



6-Meyveler Olgunlaşmaya Başladığında;

Soluprod 10.5.35	250 gr/100 lt su
Correctus	250 ml/100 lt su



ZEYTİN DAMLAMA PROGRAMI

1-Çiçeklenme Öncesi;

Soluprod 10.52.10 3kg/da

2-Meyveler Nohut Büyüklüğüne Geldiğinde;

Soluprod 20.20.20 3 kg/da

3-Meyveler Olgunlaşmaya Başladığında;

Soluprod 10.5.35 3kg/da