

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

BİTKİ	DOZU (Yapraktan)	UYGULAMA ŞEKLİ ve DÖNEMİ
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Nar, Şeftali, Kivi, Erik vb.)	250-300 ml/100 lt su	Çiçeklenme öncesinden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama, hasat sonrası yaprak dökümünden önce 1 uygulama
Narenciye	250-300 ml/ 100 lt su	Çiçeklenme öncesinden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar vb.)	200-300 ml/da	Dikimden sonra 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama
Bağ	200-250 ml/ 100 lt su	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama
Çilek	250-300 ml/da	Çiçeklenmeden itibaren 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama
Zeytin	200-250 ml/100 lt su	Çiçek başlangıcı ve meyve tutumu olmak üzere 1-2 uygulama
Patates	200-300 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama
Buğday, Arpa, Kanola, Çeltik vb.	100-200 ml/da	Kardeşlenme dönemi 1 uygulama, çiçeklenme öncesi 1 uygulama
Şeker Pancarı, Ayçiçeği	100-200 ml/da	Bitkilerin 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Pamuk	150-250 ml/da	Çiçeklenme itibarıyla 10-15 gün ara ile 1-2 uygulama
Soya, Yer Fıstığı	100-200 ml/da	Bitkilerin 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Kesme Çiçekçilik	100-200 ml/100 lt su	Yapraklanmadan itibaren 1-2 uygulama

Piyasaya sunacağımız ürünün yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığını ve piyasada bu etiketin kullanılacağını beyan eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

EC FERTİLİZER

KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

CAPFOL

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Suda çözünür Kalsiyum Oksit (CaO).....13
Suda çözünür Çinko (Zn).....0.8

pH: 1.8-2.6

Klor (Cl) içeriği: < % 22

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan, yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Orijinal paket dışında paketleme yapmayınız.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Kullanımdan sonra kıyafetlerinizi ve ellerinizi yıkayınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



GHS05

Dikkat!
Tahrir edicidir.

Üretim Tarihi:
Son kullanma Tarihi:
Şarj numarası:
Lisans no: 1687
Tescil no:

Net Ağırlık: kg
Hacim: lt

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında - 5 ile + 40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerde ağız iyice kapalı muhafaza ediniz.

KARIŞABİLİRLİK

CAPFOL birçok pestisit ve gübre ile karışabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme yapılması ve karışım tankına en son olarak ilave edilmesi tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA**AGRONUTRITION**

Parc Activestre 3, Avenue de l'Orchidée
31390 Carbonne / FRANSA
Tel: +33 5 61 97 85 00

İTHALATÇI FİRMA**LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.**

Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8
34726 Fenerbahçe-Kadıköy/İstanbul
Tel: (216) 411 12 24 (3 hat)

12.09.19.
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
İstanbul Genel Müdürlüğü

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.