

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

BİTKİ	DOZU (Yapraktan)	UYGULAMA ŞEKLİ ve DÖNEMİ
Bağ	150-200 g/100 lt su	Salkım oluşumunda 1 uygulama
	400 g/100 lt su	Hasat sonrası
Tarla Bitkileri (Buğday Arpa, Mısır vb.)	150-200 g/da	Kardeşlenme başlangıcından itibaren 1-2 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Nar, Şeftali, Fındık vb.)	150-200 g/100 lt su	Çiçeklenme başlangıcı, Meyve oluşum dönemi
	250-300 g/ 100 lt su	Hasat sonrası
Narenciye	100 g/100 lt su	Çiçeklenme öncesi
	150-200 g/100 lt su	Hasat sonrası
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Karpuz, Kavun vb.)	100-200 g/da	Çiçek öncesi ve sonrası 1-2 uygulama
Lahana, Brokoli, Ispanak vb.	100-200g/da	6-8 yapraktan itibaren 1-2 uygulama
Yağlı Tohumlar, Kolza	150-200 g/da	2-3 yapraklı dönemden çiçek başlangıcına kadar 1-2 uygulama
Ayçiçeği, Mısır vb.	200-300 g/da	4-6 yapraklı dönemden itibaren 1- 2 uygulama
Pamuk	150-200 g/da	6-8 yapraktan itibaren 2-3 uygulama
Pancar	300- 400 g/da	6-8 yapraktan itibaren 1-2 uygulama
Zeytin	150-200 g/100 lt su	Çiçeklenme öncesi Çiçek sonrası ve Hasat sonrası olmak üzere 3 uygulama
Yer Fıstığı	200-250 g/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün arayla 1-2 uygulama

Piyasaya sunacağımız ürünün yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığını ve piyasada bu etiketin kullanılacağını beyan eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi pesinen kabul ederiz.



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

EC FERTİLİZER

Bor (B) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

ZINK O BOR

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Suda çözünür Bor (B).....13

Suda çözünür Çinko (Zn).....4

pH: 4.8 – 6.5

Klor (Cl) içeriği: <% 2 'Kloru düşük'

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

KARIŞILIRLIK

ZINK O BOR birçok pestisit ve gübre ile karışabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

AGRONUTRITION

Parc Activestre 3, Avenue de l'Orchidee

31390 Carbonne / FRANSA

Tel: +33 5 61 97 85 00

İTHALATCI FİRMA

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.

Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8

34726 Fenerbahçe-Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 411 12 24 (3 hat)

Üretim Tarihi:

Son kullanma Tarihi:

Şarj numarası:

Lisans no: 1687

Tescil no:

Net Ağırlık: kg

