

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

Bitki	Uygulama Dozu		Uygulama Şekli ve Dönemi
	Sulama Suyu ile Toprakta	Yapraktan	
Açık Tarla Sebzeleri Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun, Karpuz, Çilek, Soğan vb.	500-1000 ml/da	100-150 ml/da	10-15 gün ara ile çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 2-3 uygulama
Sera ve Örtüaltı Sebzeleri	500-1000 ml/da	100-150 ml/100 L su	10-15 gün ara ile çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 2-3 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Ayva, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Nar, Muz, Narenciye)	500-1000 ml/da	100-150 ml/100 L su	Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 1 uygulama hasat sonrası 1 uygulama
Bağ	500-1000 ml/da	150-200 ml/100 L su	10-15 gün ara ile çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 2-3 uygulama
Zeytin	500-1000 ml/da	150-200 ml/100 L su	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası 1 uygulama, hasat öncesi veya sonrası 1 uygulama
Narenciye	500-1000 ml/da	100-150 ml/100 L su	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası 1 uygulama, hasat öncesi veya sonrası 1 uygulama
Fındık	500-1000 ml/da	100 ml/Ocak	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası ve hasat sonrası 10-15 gün arayla 2-3 uygulama
Patates, Havuç	500-1000 ml/da	100-150 ml/da	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası ve hasat sonrası 10-15 gün arayla 2-3 uygulama
Şeker Pancarı	500-1000 ml/da	100-150 ml/da	Yumru oluşumundan önce 1 uygulama, 15-20 gün arayla 2. ve 3. uygulama
Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır	500-1000 ml/da	100 ml/da	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası 10-15 gün ara ile 1-2 uygulama
Pamuk	500-1000 ml/da	100 ml/da	Çiçeklenme öncesinde 1 uygulama veya doz bölünerek 2 uygulama

Piyasaya sunacağımızı etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

EC FERTİLİZER
Bakırlı Gübre Çözeltisi
(Bakır Sülfat içerikli)

GLUCONEX

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Suda çözünür Bakır (Cu)..... 6

pH 4,1-5,3

Klor (Cl) içeriği: < 0.3% "Kloru düşük"

UYARILAR

- **Asla uygun doz oranını aşmayınız.**
- **Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.**
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

KARISABİLİRLİK

Birçok pestisit ve gübre ile karışım halinde kullanılabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

AGRONUTRITION

Parc Activestre

3, Avenue de l'Orchidée

31390 CARBONNE – FRANSA

Tel: +33 05.61.97.85.00

www.agronutrition.com

İTHALATÇI

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.

Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8

34726 Fenerbahçe-Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 411 12 24 (3 hat)

www.lanceslink.com

Üretim Tarihi:

Son kullanma Tarihi:

Şarj numarası:

Lisans no: 1687

Tescil no:

Net Hacim: L

Net Ağırlık: kg

LANCES LINK
Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.