

ÖZELLİKLER:

POLLIFLOR, bor eksikliğini giderilmesinde kullanılır. Bitkilerin büyüme döneminde dengeli beslenme ihtiyacını karşılar.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI:

Bitki	Dozu (Yaprak)	Uygulama Zamanı
Bağ	200 ml/100 lt su	Çiçeklenmeden önce ve sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, armut, Kiraz, Şeftali, Nar, Narenciye, Erik)	200 ml/100 lt su	Çiçek öncüsünden meyve oluşum dönemine kadar 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Karnabahar, Lahana, Havuç vb.)	200 ml/da	Dikimden sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Çilek	200 ml/da (tarla) 200 ml/100 lt su (sera)	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Karpuz, Kavun	150-200 ml/da	Dikimden sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Muz	250 ml/100 lt su	Vejetatif gelişme başladıktan sonra 2-3 hafta ara ile 3-5 uygulama
Fındık	200-250 ml/100 lt su	Çiçeklenme öncesi, taç yaprak döktümü ve meyve tutum dönemlerinde
Şeker pancarı	200-300 ml/da	6-8 yapraklı dönemden hasat zamanına kadar 2 uygulama
Ayçiçeği	100-150 ml/da	1. uygulama: Yapraklanma dönemi 2. uygulama: Çiçeklenme öncesi 3. uygulama: Dane tutum dönemi
Pamuk	125-150 ml/da	Taraklanma başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama
Baklagiller	150-200 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Patates	125-150 ml/da	Çiçeklenme öncesinden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Zeytin	100-200 ml/100 lt su	1. uygulama: Çiçeklenme öncesi 2. uygulama: Çiçeklenme sonrası 3. uygulama: Dane oluşum dönemi
Mısır	150-250 ml/da	6-8 yapraklı dönemde 1-2 uygulama
Baklagiller	150-200 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Yerfıstığı	200 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Kanola	100-200 ml/da	2-3 yapraklı dönemden çiçek başlangıcına kadar 1-2 uygulama
Hububat, Çeltik	100-200 ml/da	Kardeşlenme döneminden itibaren 2-3 uygulama

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi kesinen kabul ederiz.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

KARISILIRLIK

POLLIFLOR birçok pestisit ve gübre ile karışım halinde kullanılabilir. Bakır ve ağır metal içeren gübreler ile karıştırmayınız.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

AGRONUTRITION

Parc Activestre 3, Avenue De l'Orchidee

31390 Carbone/FRANSA

Tel: +33 05 61 97 85 00

İTHALATÇI:

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No:32/8

34726 Fenerbahçe/ Kadıköy/İstanbul

Tel: 0 216 411 12 24 (3 hat)

www.lanceslink.com

Üretim Tarihi:

Son kullanma Tarihi:

Şarj numarası:


Lisans no: 1687

Tescil no: 27367

Net Ağırlık: kg

Hacim: lt

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.



Kımya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

EC FERTİLİZER

ÇÖZELTİDE BORATLI GÜBRE

(Boron Etanol Amin içerikli)

POLLIFLOR

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Suda çözümlür Bor (B)7

pH: 8.1-9.3

Klor (Cl) içeriği: < % 2 'Kloru düşük'

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

