


İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve No'su : 08.02.2022/12249

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı Organizma	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile hasar arasındaki süre
Kabak	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/da	3 gün
Domates (Sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	50 ml/da 100 ml/100 L su (Larva)	3 gün
Patıcan (Tarla)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/da (Larva-Pupa-Ergin)	3 gün
Fasulye	Bakla yaprakbiti (<i>Aphis fabae</i>)	50 ml/da	3 gün
Elma	Elma içkurdur (<i>Cydia pomonella</i>)	15 ml/100 L su	3 gün
	Elma ağkurdur (<i>Yponomeuta malinellus</i>)	5 ml/100 L su	
Bağ*	Dürmece (<i>Sparganothis pilleriana</i>)	50 ml/100 L su	3 gün
	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	30 ml/100 L su	
Armut	Armut Psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	50 ml/100 L su	3 gün
Antepfıstığı	Antepfıstığı Psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	30 ml/100 L su	3 gün
PATATES	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineate</i>)	30 ml/da	3 gün
Nohut, Mercimek	Mercimek Hortumluböceği (<i>Sitona sp.</i>)	50 ml/da	3 gün
	Mercimekte Apion (<i>Apion arrogans</i>)	50 ml/da	
	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	20 ml/da	
	Mantolu böcek (<i>Amicta obobethuri</i>)	30ml/da	
Mısır	Mısır koçankurdur (<i>Sesamia nonagrioides</i>)	50 ml/da (15 gün ara ile 3 uygulama)	3 gün
Şekerpancırı	Pancar pireleri (<i>Chaetochneuma Spp.</i>)	25 ml/da	3 gün
	Bozkurt (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>)		
	Kalkan böcekleri (<i>Cassida spp.</i>)		
Hububat	Süne (<i>Eurygaster spp.</i>)	30 ml/da (1-3 dönem nimf 50 ml/da (4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin)	3 gün
	Hububat hortumluböceği (<i>Pachytichus hordei</i>)	30 ml/da	
	Ekin kamburböceği (<i>Zabrus spp.</i>)	20 ml/da (satış uygulaması)	
Zeytin	Zeytin sineği (<i>Bactrocera oleae</i>)	25 ml/100 L su	3 gün
	Zeytin güvesi (<i>Prays oleae</i>)	30 ml/100 L su	
	Zeytin karakoşnili (<i>Saissetia oleae</i>)	25 ml/100 L su	
Ayçiçeği	Ayçiçeğinde Çayır tırtılı (<i>Loxostege sticticalis</i>)	25 ml/100 L su	3 gün
	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	75 ml/100 L su	
Fındık	Kırtırtılı (<i>Lymantria dispar</i>)	30 ml/100 L su	3 gün
Kiraz	Kiraz sineği (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	25 ml/100 L su	3 gün
Pırasa	Tütün tripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	50 ml/da	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

AMETRİNE EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	--------------------------

25 g/l Deltamethrin

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHA YA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Mukozayı tahriş eder. Haşıırma, ciltte yanma yapabilir. Ayrıca bulantı, kusma, baş ağrısına sebep olabilir.

İLYARDIM ÖNLEMLERİ

Göz teması: Varsa kontak lensleri çıkarın. Gözle temas durumunda, acil olarak en az 15 dakika süreyle akan temiz bol su ile yıkayın. Acı, gözde simsek çıkmama hissi, yaşarma veya kızarıklık gözlenirse tıbbi yardım alın.

Cilt teması: Ürünle bulaşmış giysileri çıkarın. Etkilenmiş cilt bölgesini su ve hafif bir sabunla yıkayın. Sıcak suyla durulayın. Hastalık etkisi veya tahriş olursa tıbbi yardım alın.

Soluma: Temiz havaya çıkınız. Solunumun zorlaşması halinde oksijen veriniz. Solunum durmuşsa suni solunum uygulayınız. Acilen tıbbi yardım alın.

Yutma: Kusturmayınız. Yutulmuşsa, maruziyete uğramış kişinin bilinci yerindeyse ağzı su ile yıkayın.(gargara yaptırın) Tıbbi yardım alın, mümkünse ürünün etiketini gösterin.

ANTİDÖTÜ, TEDAVİSİ VE GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik göre tedavi uygulanır. Acil durumlarda hastalığın şiddetine ve hastalığın ağırlığına göre 10-20mg Diazepam (VALINUM) enjekte ediniz.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

03 Kasım 2022

SS A

Net Miktarı :
Aza. Per. Sat. Fiyatı (KDV' li) :
İÇİNDEKİLER
Deltamethrin, Ksilen, Emulsifier
UYARI KELİMESİ
Tehlike
ZARARLILIK İŞARETLERİ



ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P261 Tozunu, dumanını, gazını, sisini, buharını, spreyini solumaktan kaçının.
P280 Göz koruyucu, koruyucu kıyafet, koruyucu eldivenler, yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501 İçeriği/kabı onaylanmış atık toplama alanlarında bertaraf edin

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- AMETRİNE tüm koruyucu tedbirler alınarak orijinal ambalajında depolanmalıdır.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresine uyunuz.
- İlaçlamadan sonra elbiselerinizi çıkarıp, el ve yüzünüzü bol su ve sabunla yıkayınız.
- Tıkanmış adaptörleri ağızınızla üfleterek açmayınız, fırça ile temizleyiniz

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Cm. Cami Tıbbi Cad. Yavuz Atıllı 32-8
07050 Fethiye / Muğla
Tic. Sic. No: 27420
Vergi No: 3131000000

BORA KANBAR
RUHSATLANDIRMA MÜDÜRÜ

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti eder. İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez.

Buğday: Ekin kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.
Hububat hortumluböceği: Toprakтан çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.
Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.
Mısır koçankurduna karşı: ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.
Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde % 10'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10'unda canlı "yumurta+larva" olduğunda ilaçlama yapılır.
Zeytin sineğine karşı: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.
Zeytin Karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların % 50 sinin açıldığı devrede birinci, % 90'ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.
Kiraz sineğine karşı: görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gereklidir.
Pırasa Tütün tripsine karşı: bitki gelişmesinin orta dönemlerinde bitki başına ortalama 30 trips mücadele eşliğidir.
DİRENÇ YÖNETİMİ
AMETRİNE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için AMETRİNE'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
KARİŞABİLİRLİK DURUMU
Büyük miktarda karışım yapmadan ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.



25 g/l Deltamethrin

ÜRETİM TESİSİ
FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇLAR TARIM ve HAYVANCILIK
NAKLİYE SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Kayacık Mah. Konya Org. San. Böl. Lalehan Cad. İkipinar Sok. No: 17
Seiçuklu KONYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA
LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Opr. Cemil Topuzlu Caddesi Yuvam Apt. No.32 D.8
34726 Fenerbahçe-Kadıköy-İSTANBUL
Tel.: +90 (216) 411 12 24-25-26
www.lanceslink.com

FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇLAR TARIM ve HAYVANCILIK
NAKLİYE SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
KONYA

03 Kasım 2022 SS A



BORA KANBAR
RUHSATLANDIRMA MÜDÜRÜ