

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 28.03.2007 / 5921

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ*	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	1. uygulama: 400 ml/100 L su 2. uygulama: 500 ml/100 L su 3. uygulama: 600 ml/100 L su	21 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	1000 ml/100 L su	14 gün
Kayısı	Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (<i>Wilsonomyces carpophylus = Stigmia carpophila</i>)	1. uygulama: 1000 ml/100 L su (Dormant dönem) 2. uygulama: 600 ml/100 L su (İlkbahar uygulaması) 3. uygulama: 600 ml/100 L su (İlkbahar uygulaması)	14 gün
Zeytin	Halkalı Leke (<i>Spilocaea oleaginea = Cycloconium oleaginum</i>)	1000 ml / 100 L su	-
Şeftali	Yaprak Kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	1000 ml / 100 L su	14 gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	600 ml/ da	14 gün
Portakal	Turuncgil meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	500 ml / 100 L su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.



LANCES LINK®

BORDOFLOW®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	----------------------------

124 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer
Bordo Bulamacı

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA BİR GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Ağızda madeni lezzet, kanlı ishal, mavi yeşil renkli kusma, hızlı soluma, heyecan, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme, kan basıncında artış, fazla miktarda alındığında (5-8 gr) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı.
İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Şüpheli bir durumda veya belirtiler var ise bir doktora başvurun ve güvenlik bilgi formunu gösterin. Zehirlenme durumunda ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Solunması halinde: Uygun havalandırma kullanılarak maruziyeti azaltın. Kazazedeği temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alacağı pozisyonda dinlendirin. Kendinizi iyi hissetmezseniz ZEHİR MERKEZİ'ni veya doktor/hekimi arayın.

Deri ile teması halinde: Kirlenen giysiyi çıkarın, su ve sabunla yıkayın. Tahriş durumunda, bir doktor ya da ZEHİR MERKEZİ'ni arayın.

Yutulması halinde: Hemen ZEHİR MERKEZİ'ne veya doktora başvurun. Onlara ürün güvenlik formunu ve etiketi gösterin. Bilinci açık olmayan kişiye ağızdan bir şey vermeyin.

Göz ile teması halinde: Hemen bol su ile yıkayın, ilk yıkamadan sonra kontakt lens varsa çıkarın ve en az 15-30 dk yıkamaya devam edin. Hemen tıbbi yardım alın.

N. Durmuş
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

NET MİKTARI (L) :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ : Ek-1
FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER:

Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

ZARARLILIK İŞARETİ:



Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102: Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P260 : Tozunu solumayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P285: Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayın.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sulara bulaştırmayınız.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Gazimihal Mah. No: 10 SR. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova / İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Faks: 0232 202 11 44
Sermayesi: 500.000 TL
Mersis No: 0608001426500013

BORA KANBAR
Ruhsatlandırma Müdürü

06 Kasım 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Mildiyözü:

1. Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır. 2. ve diğer Uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Elma Karalekesi : 1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), 3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer Uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çil) (Kayısı) : 1. Uygulama: Sonbaharda (Dormant dönem) yaprak dökümünden hemen sonra yapılır. 2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcuqları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde) yapılır. 3.Uygulama: meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılır.

06 Kasım 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

BORDOFLOW®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	----------------------------

124 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer
Bordo Bulamacı

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ : Methemoglobinemi, BAL, DMPS, EDTA, D-penisilamin için Metilen Blue uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ar
açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma
ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde
hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

Ek-1



LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazım Dirlik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Hesap Numarası: V.D. 48 000 4265
V.D. 48 000 000 TL

Mersis No: 0608001426500013

BORA KANBAR

Ruhsatlandırma Müdürü

Zeytinlerde Halkalı Leke:

Ege Bölgesinde :

1. Uygulama : İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. Uygulama : Çiçek somakları belirginleştikten sonra , çiçekler açmadan önce,

Marmara Bölgesinde :

1. Uygulama : Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. Uygulama : Çiçek somakları belirginleştikten sonra , çiçekler açmadan önce,
3. Uygulama : Çiçek somakları belirginleştikten sonra , çiçekler açmadan önce,

Akdeniz Bölgesinde :

1. Uygulama : Hasattan sonra
2. Uygulama : İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
3. Uygulama : Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gerekmektedir.

Şeftali Yaprak Kıvrıklığı:

1. Uygulama : Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra
2. Uygulama : İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Domates Mildiyözü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına bağlı olarak uygulamaya 7-10 gün ara ile devam edilir.

Portakal Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması:

Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1. Uygulama : Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
2. Uygulama : Havalarda yağışlı giderse 1. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarına karşı:

Gövde veya kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BORDOFLOW isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre **Grup M1** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **BORDOFLOW**'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 hariç) fungisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

BORDOFLOW diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.



LANCES LINK®

Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

BORDOFLOW®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	----------------------------

124 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer
Bordo Bulamacı

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ : Methemoglobinemi, BAL, DMPS, EDTA, D-penisilamin için Metilen Blue uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): 114

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. ' Ek-1
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No. ...
Bornova / İZMİR
Tel: 0232 202 11 44
www.lanceslink.com

ÜRETİCİ FİRMA:

MANICA S.P.A
Via All'adige 4,
38068 Rovereto, (Trento) İtalya
Tel: +39 0464 433705

ÜRETİM TESİSİ:

MANICA S.P.A
Via All'adige 4,
38068 Rovereto, (Trento) İtalya
Tel: +39 0464 433705



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

LANCES LINK

KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Halkalı Leke Üretimi VAD: 000 001 4265
Seri No: 000 000 000
Mersis No: 0608001426500013

BORA KANBAR
Ruhsatlandırma Müdürü