

## KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

BİTKİ	DOZU (Yapraktan)	UYGULAMA ŞEKLİ ve DÖNEMİ
Bağ	200-250 ml/100 L su	Çiçeklenme dönemi öncesi ve sonrası 2 uygulama yapılır.
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz vb.)	200-250 ml/da	Gelişim dönemi boyunca 10 gün ara ile 1-2 uygulama yapılır.
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Fındık vb.)	200-250 ml/100 L su	1.uygulama: Çiçek başlangıcı 2.uygulama: Meyve büyüme döneminde 3.uygulama: Hasattan sonra yapılır.
Narenciye	200-250 ml/100 L su	Çiçek başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 1-2 uygulama yapılır.
Arpa, Buğday, Çeltik	150-250 ml/da	Kardeşlenme başlangıcından itibaren 1-2 uygulama yapılır.
Pamuk, Patates, Şeker Pancarı	150-250 ml/da	Sürgün çıkışı sonrası gelişme döneminde 10 gün ara ile 1-2 uygulama yapılır.
Ayçiçeği, Mısır	250 ml/da	5-6 yaprak döneminde 1-2 uygulama yapılır.
Zeytin	250 ml/100 L su	1.uyg. Gözler patlarken 2.uyg. Çiçeklenme öncesi 3.uyg. Hasat sonrası yapılır.
Çilek	200 ml/da	1.uygulama: Çiçek başlangıcı 2.uygulama: Meyve büyüme döneminde 3.uygulama: Hasattan sonra yapılır.
Yer Fıstığı	200-250 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama yapılır.

Piyasaya sunacağımız ürünün yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığını ve piyasada bu etiketin kullanılacağını beyan eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



## EC FERTİLİZER

### PK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

# STIMPHOS Zn

## 0 - 29 - 5 + TE

### GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Suda çözünür Fosfor Penta Oksit (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>).....29

Suda çözünür Potasyum Oksit (K<sub>2</sub>O).....5

Toplam Çinko (Zn).....6.7

pH: 1.8 – 3.0

### UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



GHS05

**Dikkat!**

**Tahriş edicidir.**

### DEPOLAMA

Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

### KARIŞABİLİRLİK

STIMPHOS Zn 0 - 29 - 5 + TE, birçok pestisit ve gübre ile karışabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

### FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

### ÜRETİCİ FİRMA

AGRONUTRITION

Parc Activestre 3, Avenue de l'Orchidée

31390 Carbonne / FRANSA

Tel: +33 5 61 97 85 00

### İTHALATCI FİRMA

LANCES LINK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.

Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217

35100 Bornova / İZMİR

Tel: 0232 202 11 44

[www.lanceslink.com](http://www.lanceslink.com)

Üretim Tarihi:

Son kullanma Tarihi:

Şarj numarası:

Lisans no: 1687

Tescil no: 33184

Net Ağırlık: kg

Hacim: lt