

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

| BİTKİ | DOZU (Yapraktan) | UYGULAMA ŞEKLİ ve DÖNEMİ |
|---|---------------------|--|
| Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Nar, Şeftali, Kivi, Erik vb.) | 250-300 ml/100 L su | Çiçeklenme öncesinden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama, hasat sonrası yaprak dökümünden önce 1 uygulama |
| Narenciye | 250-300 ml/100 L su | Çiçeklenme öncesinden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama |
| Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar vb.) | 200-300 ml/da | Dikimden sonra 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama |
| Bağ | 200-250 ml/100 L su | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama |
| Çilek | 250-300 ml/da | Çiçeklenmeden itibaren 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama |
| Zeytin | 200-250 ml/100 L su | Çiçek başlangıcı ve meyve tutumu olmak üzere 1-2 uygulama |
| Patates | 200-300 ml/da | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama |
| Buğday, Arpa, Kanola, Çeltik vb. | 100-200 ml/da | Kardeşlenme dönemi 1 uygulama, çiçeklenme öncesi 1 uygulama |
| Şeker Pancarı, Ayçiçeği, Mısır, Bezelye | 100-200 ml/da | Bitkilerin 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama |
| Pamuk | 150-250 ml/da | Çiçeklenme itibarıyla 10-15 gün ara ile 1-2 uygulama |
| Soya, Yer Fıstığı | 100-200 ml/da | Bitkilerin 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama |
| Kesme Çiçekçilik | 100-200 ml/100 L su | Yapraklanmadan itibaren 1-2 uygulama |

Piyasaya sunacağımız ürünün yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığını ve piyasada bu etiketin kullanılacağını beyan eder, aksinin tesbiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz



LANCES LINK®
Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

EC FERTİLİZER

KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

CAPFOL

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w (%)

Suda çözünür Kalsiyum Oksit (CaO).....13
Suda çözünür Çinko (Zn).....0.8

pH: 1.6-2.8

UYARILAR

- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan, yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Orijinal paket dışında paketleme yapmayınız.
- Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız.
- Kullanımdan sonra kıyafetlerinizi ve ellerinizi yıkayınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



GHS05

Dikkat!
Tahrir edicidir.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajında - 5 ile + 40 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerde ağzı iyice kapalı muhafaza ediniz.

KARISABİLİRLİK

CAPFOL birçok pestisit ve gübre ile karışabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme yapılması ve karışım tankına en son olarak ilave edilmesi tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

AGRONUTRITION

Parc Activestre 3, Avenue de l'Orchidée
31390 Carbonne / FRANSA
Tel: +33 5 61 97 85 00

İTHALATÇI FİRMA

LANCES LİNK KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0232 202 11 44
www.lanceslink.com

Üretim Tarihi:

Son kullanma Tarihi:

Şarj numarası:

Lisans no: 1687

Tescil no:34421

Net Ağırlık: kg

Hacim: L

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8 İç Kapı No: 217
35100 Bornova / İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Hesap Numarası: 08070000000000000000
Seri No: 00000000000000000000
Mersis No: 0608001426500013