

BİTKİ	DOZU (Yapraktan)	UYGULAMA DÖNEMİ
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz vb.)	200-250 g/100 L su	Meyveler büyümeye başladıktan sonra hasat öncesine kadar 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama yapılır.
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Ispanak, Brokoli, Karnabahar vb.)	150-250 g/da	Meyve gelişim döneminden sonra 2-3 uygulama yapılır.
Narenciye	200-250 g/100 L su	Meyve oluşumundan itibaren 10- 15 gün ara ile 4-6 uygulama yapılır.
Bağ	200-250 g/100 L su	Danelerin olgunlaşmasından sonra 10 gün ara ile 2-4 uygulama yapılır.
Pamuk	150-200 g/da	Çiçeklenme sonrası koza döneminde 1-2 uygulama
Mısır, Ayçiçeği	200 g/da	4-6 yaprak döneminden başlayarak hasat öncesine kadar 10-15 gün ara ile uygulanır.
Buğday, Arpa, Çeltik	150-200 g/da	Kardeşlenme döneminden itibaren 2-3 uygulama yapılır.
Çilek	150-250 g/da	Meyve gelişim döneminden itibaren 2-3 uygulama yapılır.
Kavun-Karpuz	100-200 g/da	Meyve gelişim döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Zeytin	100-200 g/100 L su	Meyvelerin büyümeye başlaması ile hasattan 2 hafta öncesin ekadar 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.
Muz	200-250 g /100 L su	Meyve oluşumundan itibaren büyüme dönemi boyunca 2-4 uygulama
Şeker Pancarı Patates	150-250 g/da	Yumru oluşumundan itibaren 2-3 uygulama



LANCES LINK®
Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirlik Muh. 294 Sk. No: 8-İç Kapı No: 217
35100 Bornova/İZMİR Tel: 0232 202 1664
Haberleşim: 0506 001 4265
Sermaye: 3.000.000 TL
Mersis No: 0608001426500013