

AZOFOL

Formülasyon: Lignosülfonat



İçerik (%)	
Toplam Azot (N)	: 16
Üre Azotu (N)	: 16
pH	: 5.1 - 6.3
Klor içermez.	

Ambalaj Uygulama Raf Ömrü
1 LT / 5 LT / 10 LT / 20 LT Yaprak 3 Yıl

Formülasyon Özellikleri ve Faydaları:

Organik Linyinden (Odunsu madde) elde edilen linyosülfonatla kompleksli formülasyonu sayesinde metalik iyonları (Fe, Cu, Mn, Zn) şelatlar ve çözünebilir sabit kompleks form oluşturur.

Doğal adjuvant özelliğine ek olarak yayıcı yapıştırıcı ve kristalleşmeyi engelleyen nemlendirici etkiye sahiptir. Bitki tarafından %80-90 oranında alınır.

Azot ve Kürek proteinin yapı taşlarından ve fotosentezde çok önemli rolleri vardır.

Magnezyum, fotosentezdeki rolünün yanı sıra karbonhidrat ve yağ sentezinde de önemli etkiye sahiptir.

AZOFOL Azot, Magnezyum ve Kürek içerikli sıvı yaprak gübresidir. Hassasiyetle seçilen hammaddeler güçlü bir safiyet ve tam çözünürlüğü garanti altına alır.

Hasatın homojen ve kaliteli olmasını sağlar.

AZOFOL, yaprak üzerinde son derece yumuşak etkiye sahip bir formülasyondur. Kullanımı ve uygulanması çok güvenlidir. Azot ve kürek sinerjisi pülverizasyonda kolaylık sağlar.

BITKİ	DOZU (yapraktan)	UYGULAMA ŞEKLİ ve DÖNEMİ
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavur, Karpuz, Çilek vb.)	250-500 ml/da	Tam yapraklama döneminden itibaren 2-4 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Narenciye, Fındık vb.)	250-500 ml /100 lt su	Meyve oluşumundan itibaren 2 uygulama, hasat sonrası 1 uygulama
Bağ	250-500 ml /100 lt su	Sürgülerin 5-10 cm'e ulaşmasından itibaren 2-3 uygulama, hasat sonrası 1 uygulama
Muz	500 ml-1 lt /da	Sezon boyunca 3-4 uygulama
Zeytin	500 ml-1 lt /100 lt su	1. uygulama: Çiçeklenme öncesi, 2. uygulama: Meyve oluşumunda
Arpa, Buğday	500 ml-1 lt /da	1. uygulama: Kardeşlenme döneminde, 2. uygulama: Sapa kalkma - başak oluşumu döneminde
Patates, Şeker Pancarı	1-2 lt /da	Yumru oluşumundan itibaren 15 gün ara ile 3 uygulama
Mısır	500 ml-1 lt /da	1. uygulama: 4-6 yapraklı dönemde, 2. uygulama 1. uygulamadan 15 gün sonra
Ayçiçeği	500 ml-1 lt /da	4-6 yapraklı dönemde 1-2 uygulama
Soya, Yer Fıstığı	500ml-1 lt /da	Çiçeklenme başlangıcı itibarıyle 1-2 uygulama
Kanola	500 ml-1 lt /da	1. uygulama: 6-8 yapraklı dönemde, 2. uygulama: % 50 - % 80 çiçeklenme döneminde
Çeltik	1lt /da	1. uygulama: Kardeşlenme döneminde, 2. uygulama: Sapa kalkma - başak oluşumu döneminde
Parmak	500 ml-1 lt /da	6-8 yapraklı dönemden itibaren 3-4 uygulama

KARIŞABİLİRLİK

AZOFOL, bakırı preparatlar hariç birçok pestisit ve gübre ile karışabilir. Çoklu karışımında ön deneme yapılması ve karışım tankına en son olarak ilave edilmesi tavsiye edilir.