

FABRIQUÉ EN FRANCE

Bloomer

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
İZ ELEMENT KATKILI
SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w (%)
Organik Madde	14
Toplam Azot (N)	2
Suda Çözünür Bor (B)	2.3
Suda Çözünür Molibden (Mo)	4
Algünik Asit	0.01
Maksimum Klor (Cl)	1
pH:	5.9-7.9

5L

Üretici Firma: FERTIPLUS FRANCE
Tecnosud, Site 21, Bat 2A 1er étage - 230,
Rue James Watt 66100 PERPIGNAN / FRANS
Tel: +33(0)4 68 22 25 15 www.fertiplus-france.com

FERTIPLUS
by DSG

Bloomer

UYARILAR:

Asla uygun doz oranını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven takınız. Deri ve göz ile temasında bol suyla yıkayınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI:

Bitki	Dozu (Yapraktan)	Uygulama Şekli ve Dönemi
Bağ	200 ml/ 100 L su	Çiçeklenmeden önce ve sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, armut, Kiraz, Şeftali, Nar, Narenciye, Erik)	200 ml/ 100 L su	Çiçek öncesinden meyve oluşum dönemine kadar 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Karnabahar, Lahana, Havuç vb.)	200 ml/ da	Dikimden sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Çilek	200 ml/da (tarla) 200 ml/100 L su (sera)	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Karpuz, Kavun	150-200 ml/da	Dikimden sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama
Muz	250 ml/100 L su	Vejetatif gelişme başladıktan sonra 2-3 hafta ara ile 3-5 uygulama
Fındık	200-250 ml/100 L su	Çiçeklenme öncesi, taç yaprak dökümü ve meyve tutum dönemlerinde
Şeker pancarı	200-300 ml/da	6-8 yapraklı dönemden hasat zamanına kadar 2 uygulama
Ayçiçeği	100-150 ml/ da	1.uygulama: Yapraklanma dönemi 2. uygulama: Çiçeklenme öncesi 3. uygulama: Dane tutum dönemi
Pamuk	125-150 ml/da	Tarakanma başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama
Baklagiller	150-200 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Patates	150-200 ml/da	Çiçeklenme öncesinden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Zeytin	100-200 ml/100 L su	1.uygulama: Çiçeklenme öncesi 2. uygulama: Çiçeklenme sonrası 3. uygulama: Dane oluşum dönemi
Mısır	150-250 ml/da	6-8 yapraklı dönemde 1-2 uygulama
Yerfıstığı	200 ml/da	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama
Kanola	100-200 ml/da	2-3 yapraklı dönemden çiçek başlangıcına kadar 1-2 uygulama
Hububat, Çeltik	100-200 ml/da	Kardeşlenme döneminden itibaren 2-3 uygulama
Damlama Sulama	300-500 ml/da	Çiçeklenme döneminden itibaren 15 gün arayla 2-3 uygulama

İthalatçı Firma: Lances Link Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8
İç Kapı No: 217, 35100 Bornova İZMİR
Tel: 0232 202 11 44 www.lanceslink.com

DEPOLAMA: Kapalı ambalajında -5 ile +40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

KARIŞILIRLIK: Yaprak gübrelere ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir. Çoklu karışımlarda ön deneme tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI: Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydıyla ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No (Batch No) :
Lisans No : 1385
Tescil No :

LANCES LINK
by DSG

Piyasaya sunacağımız ürünün yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığını ve piyasada bu etiketin kullanılacağını beyan eder, aksinin tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz

LANCES LINK
KİMYA VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. 296 Sk. No:8
35100 Bornova / İZMİR Tel: 0232 202 11 44
Hesap No: 08070000000000000000
Sicil No: 274900
Mersis No: 060800126500013